



Graue Fleischfliege

Lateinisch: *Sarcophaga Carnaria* L.
Familie: Fleischfliegen
Orde: Zweiflügel
Status: nicht geschützt



Aussehen und Eigenschaften

Fleischfliegen sind ungefähr 1- 1½ cm groß. Die Farben sind grau mit roten Augen. In den Niederlanden gibt es rund 80 verschiedene Fleischfliegen. Die Larven leben hauptsächlich in zerfallendem Material, vorzugsweise in Fleisch.

Entwicklung und Lebensweise

Fleischfliegen durchlaufen eine vollständige Transformation (Ei-Larven-Pop-Bild). Das Weibchen legt hunderte Eier in Fleisch, zerfallendes Material, Kot oder in Gebäuden auf toten Ratten, Mäusen oder Vögeln. Die grüne Köderfliege legt auch Eier in Geschwüren und / oder Hautverletzungen bei lebenden Schafen. Nach etwa einem Tag schlüpfen die Larven, auch Maden genannt, und ernähren sich dann von dem vorhandenen Material (einschließlich lebendem Schaffleisch!). Es folgt die Pop-Phase, die durchschnittlich 8-13 Tage dauert. Eine erwachsene Fleischfliege lebt etwa 3 Wochen.

Schutzmöglichkeit

Das Weibchen der Fleischfliege zieht Fleisch an und riecht in großer Entfernung nach verfaulendem Fleisch, während das Männchen Blumen bevorzugt. Deshalb gibt es hauptsächlich Frauen in Gebäuden. Die grüne Köderfliege wird im Innenbereich nicht häufig gefunden.

Abwehr

- Lagern Sie Fleisch und Fleischerzeugnisse kühl und abgedeckt.
- Entfernen Sie tote Tiere so schnell wie möglich und bewahren Sie sie wenn möglich im Kühlschrank auf.
- Reinigen Sie die Kadaverfässer nach dem Entleeren gründlich.
- Platzieren Sie nach Möglichkeit Bildschirme für offene Türen und Fenster.

Wichtig: Gute Hygiene muss immer an erster Stelle stehen. Bereiten Sie dafür einen Reinigungsplan vor.

Bekämpfen: Entfernen Sie sofort die Quelle und reinigen Sie den Bereich anschließend gründlich. Bei Bedarf können Sie eine (lokale) chemische Kontrolle durch ten Dijk Schädlingsbekämpfung durchführen lassen.